

Shedule ng Bakuna para sa Bata

Pangalan

kaarawan

Uri ng Vaccine		Bilang ng Bakuna	Batayan ng panahon at pagitan ng Bakuna	Araw ng Bakuna	Para sa
◆Hepatitis B	inactivate vaccine	ika-1 beses	2 buwan pagkasilang		1 taon pagkasilang pababa
		ika-2 beses	pagkatapos ng 4 na linggo sa ika-1		
		ika-3 beses	pagtapos ng 20-24 na linggo sa ika-1		
☆Rotavirus	live vaccine	ika-1 beses	pang 2 buwan		mula 6 na linggo pagkasilang
		ika-2 beses	pang 3 buwan (matatapos sa ika-2 beses ang (RV1) Rotarix bakuna sa 6 na buwan)		14 linggo 5 araw kung mahuli sa simula
		ika-3 beses	pang 4 na buwan (matatapos sa ika-3 beses ang (RV5) RotaTeq vaccine sa 8 buwan)		
◆Hib (haemophilus influenza type B)	inactivate vaccine	ika-1 beses			mula 2 buwan pagkasilang hanggang 5 taong gulang pababa
		ika-2 beses	simula pang 2 buwan maglaan ng 27~56 araw na pagitan		
		ika-3 beses			
		dagdag	maglaan ng pagitan 7 na buwan mahigit pagkatapos ng ika-3 beses		
◆Pediatric Pneumococcal (PCV13)	inactivate vaccine	ika-1 beses			mula 2 buwan pagkasilang hanggang 5 taong gulang pababa
		ika-2 beses	simula pang 2 buwan maglaan ng 27~56 araw na pagitan		
		ika-3 beses			
		dagdag	12 na buwan pataas, maglaan ng 60 araw na pagitan pagtapos ng 3beses, (12-14 buwan ang batayan)		
◆Pinagsamang 4 na uri	inactivate vaccine	ika-1 beses			mula 3 buwan pagkasilang hanggang 7 taon 6 na buwan gulang pababa
		ika-2 beses	simula pang 3 buwan maglaan ng 20~56 araw na pagitan		
		ika-3 beses			
		dagdag	Pagkatapos ng 1 taon sa ika-3 (maaari din ng 6 na buwan)		
◆Pinagsamang 2 na uri	inactivate vaccine	1 beses	11 taong gulang		mula 11 - 13 taon gulang pababa
◆BCG	live vaccine	1 beses	mula 3 buwan pagkasilang - 1 taon pababa (5~8 buwan ang rekomendasyon)		1 taon pagkasilang pababa

◆MR (Measles, Rubella)	live vaccine	ika-1 beses	1 taon (Pabakunahan agad kung maaari)		1 taon – 2 taon pababa
		ika-2 beses	bago pumasok sa elementary sa loob ng 1 taon		bago pumasok sa elementary sa loob ng 1 taon
☆Beke	live vaccine	ika-1 beses	1 taon pagkasilang (Pabakunahan agad kung maaari)		
		ika-2 beses	bago pumasok sa elementary sa loob ng 1 taon		3 taon – 7 taon
◆Bulutong (Bulutong tubig)	live vaccine	ika-1 beses	1 taon pagkasilang (Pabakunahan agad kung maaari)		mula 1 taon – 3 taon pababa
		ika-2 beses	Pagkatapos ng 6 buwan sa ika-1 (maaari din ng 3 na buwan)		
◆Japanese Encephalitis	inactivate vaccine	ika-1 beses	3 taon maglaan ng 6~28 araw na pagitan		mula 6 buwan pagkasilang hanggang 7 taon 6 na buwan gulang pababa
		ika-2 beses			
		dagdag	Pagkatapos ng 1 taon sa ika-2 (maaari din ng 6 na buwan)		
		2 term	9 taong gulang		9-13 taon pababa
☆Influenza	inactivate vaccine		Taon-taon bandang October hanggang December		maglaan ng 1-4 linggong pagitan pagtapos ng ika-2 Bakuna kung 13 taon pababa. (3-4 linggo ang rekomendasyon)
☆Hepatitis A	inactivate vaccine	ika-1 beses	2-4 linggo ang pagitan sa bakuna		maaaring bakunahan ang lahat ng edad (1 taon mahigit ang rekomendasyon ng WHO)
		ika-2 beses			
		ika-3 beses	Pagkatapos ng 6 buwan sa ika-1		
◆HPV (Human Papillomavirus) (pag-iwas sa Uterus cancer)	inactivate vaccine		babae na 1st yr Junior High School (may pang 2 at pang 4, iba ang schedule sa bawat bakuna)		mula Gr.6 – 1st yr High School na babae

◆Recommend na Bakuna : Libre ayon sa patakaran kapag nagpabakuna sa takdang panahon.

☆Option na Bakuna : May bayad ang iba. Mayroon ding pampublikong tulong ayon sa gobyerno.

* Posible ang sabayang bakuna sa parehong vaccine ng color coding ng bakuna. At posible din ang sabayang bakuna kahit anong uri.

* * Ang schedule na ito ay batayan sa pamamaraan ng bakuna, kumunsulta sa titingin na Doktor kung di masusunod ang schedule o nagkasakit.