

## Calendário de Vacinação

Nome \_\_\_\_\_ Data de Nascimento \_\_\_\_\_

Tipo de Vacina		Doses	Idade Padrão de Vacinação e Intervalo das Aplicações	Data da Vacinação	População Alvo
☆Hepatite B	不	1ª Dose	2 meses após o nascimento		Todas as idades
		2ª Dose	4 semanas após a primeira dose		
		3ª Dose	24 a 28 semanas após a primeira dose		
☆Rotavírus	生	1ª Dose	2 meses de idade		A partir de 6 semanas após o nascimento. No mais tardar, a 1ª dose deve ser iniciada até 14 semanas e 5 dias após o nascimento
		2ª Dose	3 meses de idade (Monovalente=Rotarix são aplicadas duas doses e a última dose deve ser aplicada até 6 meses de idade)		
		3ª Dose	4 meses de idade (Pentavalente= Rotateq são aplicadas 3 doses e a última dose deve ser aplicada até 8 meses de idade)		
◆Hib (Haemophilus Influenzae)	不	1ª Dose	Início a partir dos 2 meses de idade com intervalo de 27 a 56 dias entre as doses		A partir de 2 meses até um dia antes de completar 5 anos
		2ª Dose			
		3ª Dose			
		Reforço	Intervalo mínimo de 7 meses após a 3ª dose		
◆Pneumonia pneumocócica 13 valente (conjugada)	不	1ª Dose	Início a partir dos 2 meses de idade com intervalo de 27 a 56 dias entre as doses		A partir de 2 meses até um dia antes de completar 5 anos
		2ª Dose			
		3ª Dose			
		Reforço	Intervalo maior que 60 dias após a 3ª dose e a idade maior que 12 meses (O padrão é entre 12 a 14 meses)		
◆Tetravalente	不	1ª Dose	Início a partir dos 3 meses de idade com intervalo de 20 a 56 dias entre as doses		A partir de 3 meses até um dia antes de completar 7 anos e 6 meses de idade
		2ª Dose			
		3ª Dose			
		Reforço	Intervalo de 1 ano após a 3ª dose (É possível após 6 meses)		
◆Bivalente	不	Uma Dose	11 anos		A partir de 11 anos até 1 dia antes de completar 13 anos
◆BCG	生	Uma Dose	A partir de 3 meses até 1 dia antes de completar 1 ano (Recomendado entre 5 a 8 meses)		Até 1 dia antes de completar 1 ano de idade
◆MR (Sarampo, Rubéola)	生	1ª Dose	1 ano (O mais cedo possível)		A partir de 1 ano até 1 dia antes de completar 2 anos
		2ª Dose	Período de 1 ano até antes de ingressar no Shougakkou		Período de 1 ano até antes de ingressar no Shougakkou

☆Caxumba	生	1ª Dose	1 ano após o nascimento (O mais cedo possível)		
		2ª Dose	Período de 1 ano até antes de ingressar no Shougakkou		Entre 3 a 7 anos de idade
◆Varicela (Catapora)	生	1ª Dose	Início a partir de 1 ano (O mais cedo possível)		A partir de 1 ano até 1 dia antes de completar 3 anos
		2ª Dose	Intervalo de 6 meses após a 1ª dose (Possível com 3 meses)		
◆Encefalite japonesa	不	1ª Dose	3 anos	Intervalo de 6 a 28 dias entre as doses	A partir de 6 meses de idade até 1 dia antes de completar 7 anos e meio
		2ª Dose			
		Reforço	1 ano após a 2ª dose (Possível com 6 meses)		
		2ª Fase	9 anos		A partir de 9 anos até 1 dia antes de completar 13 anos
☆Influenza	不		Todos os anos entre outubro a dezembro		Menores de 13 anos, aplicar duas doses com intervalo de 1 a 4 semanas (Recomendado entre 3 a 4 semanas)
☆Hepatite A	不	1ª Dose	Intervalo de 2 a 4 semanas entre as doses		Possível aplicar em todas as idades (A OMS recomenda em maiores de 1 ano de idade)
		2ª Dose			
		3ª Dose	6 meses após a 1ª dose		
◆HPV (Papilomavirus Humano) (Prevenção do câncer de colo uterino)	不		Meninas que estão no Chuugaku 1 nen (Existem 2 tipos de vacinas, bivalente =CERVARIX e quadrivalente=GARDASIL, com calendários diferentes)		Meninas a partir do Shougakkou 6 nen até Koukou 1 nen

◆Vacinas de Rotina: Por regra, são gratuitas quando aplicadas dentro do período determinado.

☆Vacinas Opcionais: A maioria são cobradas. Há prefeituras que dão ajuda de custo.

不: Vacina Inativada

生: Vacinada atenuada

\* As vacinas de cores iguais podem ser aplicadas juntas (simultâneas). É possível aplicar vários tipos de vacinas simultaneamente.

\* \* Este é o calendário padrão de vacinação. Caso não for possível tomar as vacinas dentro da programação devido a doenças, por exemplo, consultar o médico da criança.