

BCG の接種年齢が 2013 年 4 月から変更になりました。

変更前	変更後
生後 6 ヶ月まで	生後 5 ~ 8 ヶ月 *

* 接種対象者は生後 1 歳に至るまで (1 歳のお誕生日を迎える前日まで) のお子さんで、標準的な接種期間は生後 5 ~ 8 ヶ月です。

< 注意事項 >

- ・ 原則的に生後 1 歳以上の者が接種を希望する場合は任意、有料で接種する。
- ・ これまでどおりツベルクリン反応は実施しない。

แจ้งการเปลี่ยนแปลงเรื่องอายุผู้รับการฉีดวัคซีน บี ซี จี ตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 2013 เป็นต้นไป

ก่อน	หลัง
หลังคลอดจนอายุถึง 6 เดือน	ช่วงอายุตั้งแต่อายุ 5 เดือนถึงอายุ 8 เดือน*

- * ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนคือ เด็กที่มีอายุก่อนครบ 1 ปี (ก่อนถึงวันเกิดที่อายุเต็ม 1 ปี)
อายุมาตรฐานในการฉีดวัคซีนคือตั้งแต่อายุ 5 เดือนจนถึงอายุ 8 เดือน

(ข้อควรระวัง)

- ตามหลักการแล้ว ไม่มีการบังคับสำหรับกรณีเด็กอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป เด็กสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ หากท่านจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
- จะไม่มีการทดสอบผลปฏิกิริยาเชื้อวัณโรค-สารทูปเบอคูลิน ตามที่เคยปฏิบัติมา