

ตารางการรับวัคซีนสำหรับเด็ก

ชื่อ _____

วันเดือนปีเกิด _____

ชนิดของวัคซีน		จำนวนครั้งที่รับวัคซีน	ระยะเวลาการรับวัคซีนตามกำหนด ช่วงรับวัคซีน	วันที่รับวัคซีน	วัยที่รับวัคซีนได้
☆ไวรัสตับอักเสบบี (HBV)	แปลยเชื้อชนิดเข็ม	ครั้งที่1	2เดือน		ทุกวัย
		ครั้งที่2	หลังจากการรับวัคซีนครั้งแรก4สัปดาห์		
		ครั้งที่3	หลังจากการรับวัคซีนครั้งแรก24-28สัปดาห์		
☆ไวรัสโรต้า โรคท้องร่วงในเด็ก	แปลยเชื้อชนิดเข็ม	ครั้งที่1	2เดือน		ตั้งแต่6สัปดาห์
		ครั้งที่2	3เดือน โดยรับวัคซีนไวรัสโรต้าแบบ 1 ชนิด (ROTARX) ครบ2ครั้งภายใน6เดือน		เริ่มครั้งแรกอย่างช้า ตั้งแต่14สัปดาห์5วัน
		ครั้งที่3	4เดือน โดยรับวัคซีนไวรัสโรต้าแบบ 5 ชนิด (ROTATEQ) ครบ3ครั้งภายใน8เดือน		
◆โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ (HIB)	แปลยเชื้อชนิดเข็ม	ครั้งที่1	ตั้งแต่เกิดถึง 2 เดือน โดย เว้นช่วง27-56วัน		ตั้งแต่2เดือนขึ้นไป ถึง ก่อนวันเกิด5ขวบเต็ม1วัน
		ครั้งที่2			
		ครั้งที่3			
		รับเพิ่ม	หลังเสร็จสิ้นครั้งที่3เว้นช่วงว่าง7เดือนขึ้นไป		
◆โรคปอดอักเสบในเด็กชนิด13 (PCV13)	แปลยเชื้อชนิดเข็ม	ครั้งที่1	ตั้งแต่เกิดถึง 2 เดือน โดย เว้นช่วง27-56วัน		ตั้งแต่2เดือนขึ้นไป ถึง ก่อนวันเกิด5ขวบเต็ม1วัน
		ครั้งที่2			
		ครั้งที่3			
		รับเพิ่ม	หลังเสร็จสิ้นครั้งที่3เว้นช่วงตั้งแต่60วันขึ้นไป, อายุ12เดือนขึ้นไป (ตามหลักคือ12-14เดือน)		
◆วัคซีนรวม4ชนิด คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ (DPT-IPV)	แปลยเชื้อชนิดเข็ม	ครั้งที่1	เริ่มตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป โดย เว้นช่วง20-56วัน		ตั้งแต่3เดือน ถึง 7ขวบ6เดือนเต็ม
		ครั้งที่2			
		ครั้งที่3			
		รับเพิ่ม	รับครบครั้งที่3เสร็จสิ้นแล้ว 1ปี(เป็นไปได้อายุช่วง6เดือน)		
◆วัคซีนรวม2ชนิด คอตีบ, บาดทะยัก (DT)	วัคซีนชนิดเชื้อตาย	1ครั้ง	11ปี		ตั้งแต่11ปีถึง13ปีเต็ม
◆วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)	วัคซีนชนิดเชื้อเป็น	1ครั้ง	ตั้งแต่ 3 เดือนถึง1ขวบเต็ม (5-8เดือนคือช่วงแนะนำ)		ไม่เกิน 1ขวบเต็ม
◆วัคซีนรวม หัด,หัดเยอรมัน (MR)	วัคซีนชนิดเชื้อเป็น	ครั้งที่1	ตั้งแต่ 1ขวบ (หากเป็นไปได้ ควรให้รับในระยะแรกๆ)		ตั้งแต่1ขวบ ถึง2ขวบเต็ม
		ครั้งที่2	ช่วง1ปีก่อนเข้าเรียนชั้นประถม		ช่วง1ปีก่อนเข้าชั้นประถม

☆ โรคคางทูม	ฉีดเข็ม ๒เข็ม	ครั้งที่1	ตั้งแต่ 1ขวบ (หากเป็นไปได ควรให้รับใน ระยะแรกๆ)		
		ครั้งที่2	ช่วง1ปีก่อนเข้าเรียนชั้นประถม		ตั้งแต่3ขวบ ถึง7 ขวบ
◆ โรคสกุไส	ฉีดเข็ม ๒เข็ม	ครั้งที่1	ตั้งแต่ 1ขวบ (หากเป็นไปได ควรให้รับใน ระยะแรกๆ)		ตั้งแต่1ขวบ ถึง3ขวบเต็ม
		ครั้งที่2	หลังรับวัคซีนครั้งที่1 ให้เว้นช่วง6เดือน (หลังรับได้ 3 เดือนก็เริ่มรับครั้งที่สองได้)		
◆ โรคไขสมองอักเสบญี่ปุ่น	ฉีดเข็ม ๒เข็ม	ครั้งที่1	3ขวบ		ตั้งแต่6เดือน ถึง 7 ขวบ 6เดือนเต็ม
		ครั้งที่2	โดยเว้นระยะ ตั้งแต่6วัน~28วัน		
		รับเพิ่ม	หลังรับครั้งที่2ได้1ปี (เป็นไปไดให้เว้นระยะ6เดือน)		
		รอบที่2	9ขวบ		ตั้งแต่9ขวบ ถึง13ปีเต็ม
☆ โรคไขหวัดใหญ่	วัคซีนชนิด เชื้อตาย	ทุกปี	รับวัคซีนช่วงระหว่างเดือนตุลาคม~ธันวาคม ของทุกปี		13ปีเต็มรับวัคซีน2ครั้ง โดย เว้นช่วงห่าง1~4สัปดาห์ (3~4สัปดาห์ช่วงแนะนำ)
☆ ไวรัสตับอักเสบบี	ฉีดเข็ม ๓เข็ม	ครั้งที่1	เว้นช่วงการรับวัคซีนห่างกัน2~4สัปดาห์		รับได้ทุกรัย (องค์การอนามัยโลกแนะนำ ในเด็กอายุ1ขวบขึ้นไป)
		ครั้งที่2			
		ครั้งที่3	หลังรับครั้งที่1เว้นช่วง 6เดือน		
◆ วัคซีนป้องกันมะเร็งปาก มดลูก (HPV)	วัคซีนชนิด เชื้อตาย		เด็กผู้หญิง ชั้นมัธยม1 (วัคซีนCERVARIXกับวัคซีนCERDASILตารางการรับ วัคซีนขึ้นอยู่กัชนิดวัคซีน)		เด็กหญิงตั้งแต่ชั้นประถม6ถึง มัธยม4

◆ วัคซีนที่รับตามระยะเวลาที่กำหนด : สามารถรับได้ฟรี เมื่อรับวัคซีนในระยะเวลาที่กำหนด

☆ วัคซีนที่เลือกรับ โดยไม่มีการบังคับ : โดยส่วนมากมีค่าใช้จ่าย อาจได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจากรัฐ ซึ่งขึ้นกันโยบายขององค์การบริหารส่วนภูมิภาค
นั้นๆ

* สิที่แบ่งแยกจำนวนครั้งของวัคซีน บ่งบอกว่า สามารถรับวัคซีนได้พร้อมกัน อีกทั้งยังสามารถรับวัคซีนได้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน

* * ตารางนี้เป็นวิธีการรับวัคซีนตามมาตรฐาน ในกรณีทีเจ็บป่วยทำให้ไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนดได้ ควรปรึกษาแพทย์