

ตารางการรับวัคซีนสำหรับเด็ก

ชื่อ _____ วันเดือนปีเกิด _____

ชนิดของวัคซีน		จำนวนครั้งที่รับวัคซีน	ระยะเวลาการรับวัคซีนตามกำหนด ช่วงรับวัคซีน	วันที่รับวัคซีน	วัยที่รับวัคซีนได้
◆ไวรัสตับอักเสบบี (HBV)	วัคซีนชนิดเข็ม	ครั้งที่ 1	2 เดือน		ไม่เกิน 1 ขวบเต็ม
		ครั้งที่ 2	หลังจากการรับวัคซีนครั้งแรก 4 สัปดาห์		
		ครั้งที่ 3	หลังจากการรับวัคซีนครั้งแรก 20-24 สัปดาห์		
☆ไวรัสโรต้า โรคท้องร่วงในเด็ก	วัคซีนชนิดเข็ม	ครั้งที่ 1	2 เดือน		ตั้งแต่ 6 สัปดาห์
		ครั้งที่ 2	3 เดือน โดยรับวัคซีนไวรัสโรต้าแบบ 1 ชนิด (ROTARIX) ครบ 2 ครั้งภายใน 6 เดือน		เริ่มครั้งแรกอย่างช้า ตั้งแต่ 14 สัปดาห์ 5 วัน
		ครั้งที่ 3	4 เดือน โดยรับวัคซีนไวรัสโรต้าแบบ 5 ชนิด (ROTATEQ) ครบ 3 ครั้งภายใน 8 เดือน		
◆โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ (HIB)	วัคซีนชนิดเข็ม	ครั้งที่ 1	ตั้งแต่เกิดถึง 2 เดือน โดย เว้นช่วง 27-56 วัน		ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ถึง ก่อนวันเกิด 5 ขวบเต็ม 1 วัน
		ครั้งที่ 2			
		ครั้งที่ 3			
		รับเพิ่ม	หลังเสร็จสิ้นครั้งที่ 3 เว้นช่วงว่าง 7 เดือนขึ้นไป		
◆โรคปอดอักเสบในเด็กชนิด 13 (PCV13)	วัคซีนชนิดเข็ม	ครั้งที่ 1	ตั้งแต่เกิดถึง 2 เดือน โดย เว้นช่วง 27-56 วัน		ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ถึง ก่อนวันเกิด 5 ขวบเต็ม 1 วัน
		ครั้งที่ 2			
		ครั้งที่ 3			
		รับเพิ่ม	หลังเสร็จสิ้นครั้งที่ 3 เว้นช่วงตั้งแต่ 60 วันขึ้นไป, อายุ 12 เดือนขึ้นไป (ตามหลักคือ 12-14 เดือน)		
◆วัคซีนรวม 4 ชนิด คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปล์โอะ (DPT-IPV)	วัคซีนชนิดเข็ม	ครั้งที่ 1	เริ่มตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป โดย เว้นช่วง 20-56 วัน		ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ขวบ 6 เดือนเต็ม
		ครั้งที่ 2			
		ครั้งที่ 3			
		รับเพิ่ม	รับครบครั้งที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว 1 ปี (เป็นไปได้อายุ 6 เดือน)		
◆วัคซีนรวม 2 ชนิด คอตีบ, บาดทะยัก (DT)	วัคซีนชนิดเชื้อตาย	1 ครั้ง	11 ปี		ตั้งแต่ 11 ปี ถึง 13 ปีเต็ม
◆วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)	วัคซีนชนิดเชื้อเป็น	1 ครั้ง	ตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ขวบเต็ม (5-8 เดือนคือช่วงแนะนำ)		ไม่เกิน 1 ขวบเต็ม
◆วัคซีนรวม หัด, หัดเยอรมัน (MR)	วัคซีนชนิดเชื้อเป็น	ครั้งที่ 1	ตั้งแต่ 1 ขวบ (หากเป็นไปได้อ ควรให้รับในระยะแรกๆ)		ตั้งแต่ 1 ขวบ ถึง 2 ขวบเต็ม
		ครั้งที่ 2	ช่วง 1 ปีก่อนเข้าเรียนชั้นประถม		ช่วง 1 ปีก่อนเข้าชั้นประถม

☆ โรคคางทูม	เป็นเชื้อไวรัส	ครั้งที่1	ตั้งแต่ 1 ขวบ (หากเป็นไปได้อ ควรให้รับใน ระยะแรกๆ)	
		ครั้งที่2	ช่วง 1 ปีก่อนเข้าเรียนชั้นประถม	ตั้งแต่ 3 ขวบ ถึง 7 ขวบ
◆ โรคสกุไส	เป็นเชื้อไวรัส	ครั้งที่1	ตั้งแต่ 1 ขวบ (หากเป็นไปได้อ ควรให้รับใน ระยะแรกๆ)	ตั้งแต่ 1 ขวบ ถึง 3 ขวบเต็ม
		ครั้งที่2	หลังรับวัคซีนครั้งที่ 1 ให้เว้นช่วง 6 เดือน (หลังรับได้ 3 เดือนก็เริ่มรับครั้งที่สองได้)	
◆ โรคไข้มองอึกเสบญี่ปุ่น	เป็นเชื้อแบคทีเรีย	ครั้งที่1	3 ขวบ	ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 7 ขวบ 6 เดือนเต็ม
		ครั้งที่2	โดยเว้นระยะ ตั้งแต่ 6 วัน ~ 28 วัน	
		รับเพิ่ม	หลังรับครั้งที่ 2 ได้ 1 ปี (เป็นไปได้อให้เว้นระยะ 6 เดือน)	
		รอบที่ 2	9 ขวบ	ตั้งแต่ 9 ขวบ ถึง 13 ปีเต็ม
☆ โรคไข้มองอึกใหญ่	วัคซีนชนิด เชื้อตาย	ทุกปี	รับวัคซีนช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ~ ธันวาคม ของทุกปี	13 ปีเต็มรับวัคซีน 2 ครั้ง โดย เว้นช่วงห่าง 1 ~ 4 สัปดาห์ (3 ~ 4 สัปดาห์ช่วงแนะนำ)
☆ ไวรัสตับอึกเสบ A	เป็นเชื้อไวรัส	ครั้งที่1		รับได้ทุกวัย (องค์การอนามัยโลกแนะนำ ในเด็กอายุ 1 ขวบขึ้นไป)
		ครั้งที่2	เว้นช่วงการรับวัคซีนห่างกัน 2 ~ 4 สัปดาห์	
		ครั้งที่3	หลังรับครั้งที่ 1 เว้นช่วง 6 เดือน	
◆ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)	วัคซีนชนิด เชื้อตาย		เด็กผู้หญิง ชั้นมัธยม 1 (วัคซีน CERVARIX กับ วัคซีน CERDASIL ตารางการรับ วัคซีนขึ้นอยู่กับชนิดวัคซีน)	เด็กหญิงตั้งแต่ชั้นประถม 6 ถึง มัธยม 4

◆ วัคซีนที่รับตามระยะเวลาที่กำหนด : สามารถรับได้ฟรี เมื่อรับวัคซีนในระยะตามเวลาที่กำหนด

☆ วัคซีนที่เลือกรับ โดยไม่มีการบังคับ : โดยส่วนมากมีค่าใช้จ่าย อาจได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจากรัฐ ซึ่งขึ้นกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนภูมิภาค นั้นๆ

* สิที่แบ่งแยกจำนวนครั้งของวัคซีน บ่งบอกว่า สามารถรับวัคซีนได้พร้อมกัน อีกทั้งยังสามารถรับวัคซีนได้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน

* * ตารางนี้เป็นวิธีการรับวัคซีนตามมาตรฐาน ในกรณีที่เจ็บป่วยทำให้ไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนดได้ ควรปรึกษาแพทย์