

Lịch tiêm vắc-xin cho trẻ

Tên

Ngày tháng năm sinh

Các loại vắc-xin		Số lần tiêm chủng	Khoảng cách giữa các lần tiêm và thời điểm tiêm theo tiêu chuẩn	Mục ghi lại việc tiêm chủng	Đối tượng được tiêm
☆Viêm gan siêu vi B	Vắc-xin bất hoạt hóa	lần thứ 1	Sau sinh 2 tháng		Toàn lứa tuổi
		lần thứ 2	cách sau 4 tuần từ lần tiêm thứ 1		
		lần thứ 3	Cách sau 24~28 tuần từ lần tiêm thứ 1		
☆Virut Rota	Vắc-xin sống	lần thứ 1	2 tháng tuổi		Từ sau sinh 6 tuần Bắt đầu tiêm lần đầu muộn lắm cũng nên tiêm đến 14 tuần 5 ngày sau sinh
		lần thứ 2	3 tháng tuổi (vắc-xin Rotarix tiêm 2 lần đến 6 tháng tuổi là kết thúc)		
		lần thứ 3	4 tháng tuổi (Vắc-xin Rotateq tiêm 3 lần đến 8 tháng tuổi là kết thúc.)		
◆Vi khuẩn Hib	Vắc-xin bất hoạt hóa	lần thứ 1			Từ sau khi sinh 2 tháng đến dưới 5 tuổi
		lần thứ 2	Bắt đầu tiêm sau sinh 2 tháng tuổi. Kỳ tiêm kế tiếp cách 27 ~ 56 ngày.		
		lần thứ 3			
		bổ sung	Cách sau khi tiêm lần thứ 3 trên 7 tháng		
◆Viêm phổi phế cầu khuẩn ở thiếu nhi (Prevenar13)	vắc-xin loại khử hoạt tính	lần thứ 1			Từ sau khi sinh 2 tháng đến dưới 5 tuổi
		lần thứ 2	Bắt đầu tiêm sau sinh 2 tháng. Kỳ tiêm kế tiếp cách 27 ~ 56 ngày.		
		lần thứ 3			
		bổ sung	Tiêm cách hơn 60 ngày sau khi tiêm kết thúc lần 3, sau sinh 12 tháng trở đi (thời gian tiêm chuẩn là: sau sinh từ 12 ~14 tháng)		
◆4 loại hỗn hợp	Vắc-xin bất hoạt hóa	lần thứ 1			Từ sau sinh 3 tháng đến dưới 7 tuổi 6 tháng
		lần thứ 2	Bắt đầu tiêm sau sinh 3 tháng. Kỳ tiêm kế tiếp cách 20 ~ 56 ngày.		
		lần thứ 3			
		bổ sung	Tiêm cách sau 1 năm từ khi tiêm lần 3 kết thúc (cách khoảng 6 tháng vẫn có thể)		
◆2 loại hỗn hợp	Vắc-xin bất hoạt hóa	1 lần	11tuổi		từ 11 tuổi đến dưới 13 tuổi .

◆Lao (BCG)	vắc-xin sống	1 lần	Sau sinh từ 3 tháng ~ dưới 1 tuổi (khuyến khích tiêm từ 5 ~ 8 tháng tuổi)		Dưới 1 tuổi sau sinh
◆sởi, sốt phát ban Rubella (MR)	vắc xin sống	lần thứ 1	1 tuổi (nên tiêm sớm nếu như có thể)		từ 1 tuổi sau sinh đến dưới 2 tuổi
		lần thứ 2	trong khoảng thời gian 1 năm trước khi vào tiểu học .		trong khoảng thời gian 1 năm trước khi vào tiểu học .
☆Quai bị	vắc-xin sống	lần thứ 1	Sau sinh 1 năm tuổi (nên tiêm sớm nếu như có thể)		
		lần thứ 2	Trước khi vào tiểu học 1 năm		Từ 3 tuổi đến 7 tuổi
◆Thủy đậu	vắc-xin sống	lần thứ 1	bắt đầu tiêm sau sinh 1 năm tuổi (nên tiêm sớm nếu như có thể)		Từ 1 tuổi đến dưới 3 tuổi
		lần thứ 2	cách 6 tháng sau khi tiêm lần 1 kết thúc (cách sau 3 tháng vẫn có thể)		
◆Viêm não Nhật Bản	Vắc-xin bất hoạt hóa	lần thứ 1	3 tuổi Lần tiêm kế tiếp cách từ 6 ngày đến 28 ngày		Từ sau sinh 6 tháng đến dưới 7 tuổi 6 tháng.
		lần thứ 2			
		bổ sung	Cách 1 năm sau lần tiêm thứ 2 (cách 6 tháng vẫn có thể)		
		kỳ 2	9 tuổi		Từ 9 tuổi đến tròn 13 tuổi
☆Cảm cúm	Vắc-xin bất hoạt hóa		mỗi năm khoảng từ tháng 10 ~ tháng 12		Trường hợp dưới 13 tuổi tiêm 2 lần cách nhau từ 1 đến 4 tuần (khuyến khích tiêm cách nhau từ 3 đến 4 tuần)
☆Viêm gan siêu vi A	Vắc-xin bất hoạt hóa	lần thứ 1	Tiêm cách nhau từ 2 ~ 4 tuần.		Mọi lứa tuổi đều có thể tiêm. (WHO .tổ chức sức khỏe thế giới khuyến khích tiêm khi đã được trên 1 tuổi.)
		lần thứ 2			
		lần thứ 3	cách 6 tháng sau tiêm đợt 1.		
◆Ung thư cổ tử cung (HPV) (ngừa ung thư cổ tử cung)	Vắc-xin bất hoạt hóa		Nữ sinh trung học năm thứ 1. (Có 2 loại Cervarix và Gardasil, Tùy vào loại vắc-xin mà lịch tiêm khác nhau.)		Nữ sinh từ lớp 6 tiểu học đến năm thứ nhất của cấp ba.

◆Tiêm chủng định kì : Tiêm trong khoảng thời gian đã được quy định thì theo nguyên tắc sẽ được tiêm miễn phí.

☆Tiêm tự nguyện : hầu hết là phải trả phí. Tùy vào từng khu vực sống mà có thể nhận được tiền hỗ trợ.

* Vắc -xin có cùng màu tô ở cột "số lần tiêm chủng" có thể tiêm đồng thời cùng một lúc. Hơn nữa, với những vắc-xin có cùng màu tô này có thể tiêm cùng lúc nhiều loại.

* * Lịch tiêm trên đây là phương pháp tiêm theo lịch mẫu chuẩn. Nhưng nếu vì lý do gì đó hay do bệnh mà không thể tiêm đúng như lịch trên thì hãy thảo luận với bác sĩ thường thăm khám.